

Cuestionario para Detección de COVID-19

Un Cuestionario Por Familia

Nombre: _____

Cantidad de Asistentes: _____

Telefono:() -

Email:

La evaluación diaria de la salud de los miembros/invitados puede ayudar a prevenir la propagación del coronavirus en la iglesia. Se recomienda usar la siguiente lista de preguntas para evaluar a miembros/asistentes para COVID-19.

Cada día, antes de cada servicio congregacional, pregúntele a cada asistente lo siguiente:

1. ¿Ha sido vacunado y esperado el período prescrito para ser protegido completamente contra Covid-19?	SI / NO									
2. ¿Usted tiene o recientemente ha tenido tos que no pueda atribuir a otra condición médica?	SI / NO									
3. ¿Usted tiene o recientemente ha tenido dificultad para respirar que no pueda atribuir a otra condición médica?	SI / NO									
4. ¿Usted tiene o recientemente ha tenido fiebre (100°F o más alta) o escalofríos que no pueda atribuir a otra condición médica?	SI / NO									
5. ¿Usted tiene algunos de los siguientes síntomas?	SI / NO									
<table border="1"> <tr> <td><input type="checkbox"/> Fatiga</td> <td><input type="checkbox"/> Perdida reciente del gusto y olfato</td> <td><input type="checkbox"/> Dolores musculares o corporales</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Congestión o secreción nasal</td> <td><input type="checkbox"/> Dolor de cabeza</td> <td><input type="checkbox"/> Nauseas o vómitos</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Dolor de garganta</td> <td><input type="checkbox"/> Diarrea</td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> Fatiga	<input type="checkbox"/> Perdida reciente del gusto y olfato	<input type="checkbox"/> Dolores musculares o corporales	<input type="checkbox"/> Congestión o secreción nasal	<input type="checkbox"/> Dolor de cabeza	<input type="checkbox"/> Nauseas o vómitos	<input type="checkbox"/> Dolor de garganta	<input type="checkbox"/> Diarrea		
<input type="checkbox"/> Fatiga	<input type="checkbox"/> Perdida reciente del gusto y olfato	<input type="checkbox"/> Dolores musculares o corporales								
<input type="checkbox"/> Congestión o secreción nasal	<input type="checkbox"/> Dolor de cabeza	<input type="checkbox"/> Nauseas o vómitos								
<input type="checkbox"/> Dolor de garganta	<input type="checkbox"/> Diarrea									
6. ¿Usted ha estado en contacto cercano (a menos de 6 pies) con alguien que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 14 días?	SI / NO									
7. ¿Ha sido vacunado y esperado el período prescrito para ser protegido completamente contra Covid-19?	SI / NO									

Si un asistente responde Sí a CUALQUIERA de las preguntas anteriores, exclúyalo de asistir al servicio.

- Los asistentes enfermos deben seguir los pasos recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés): Qué Hacer si Usted Está Enfermo.
- Los asistentes que dan positivo para COVID-19 no deben volver a la iglesia hasta que se cumplan los criterios para interrumpir el aislamiento domiciliario: Interrupción del aislamiento domiciliario para personas con COVID-19.
- Los asistentes que hayan tenido contacto cercano, durante un periodo prolongado de tiempo, con un caso de COVID-19 confirmado por un laboratorio, deben ser excluidos del asistir según lo indicado por el CDC: Recomendaciones de Salud Pública para Personas en Comunidades de los Estados Unidos Expuestas a una Persona conocida o sospechosa COVID-19, que no sean Trabajadores de la Salud u otros Trabajadores de Infraestructura Crítica y Cuando ponerse en cuarentena.
- Para orientación general para las empresas, vea: Guía interina para empresas y empleadores en su respuesta a la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19), mayo del 2020.

Si un asistente responde NO a TODAS las preguntas anteriores, permita que asista al servicio y recuérdle que debe:

- ✓ Lavarse las manos correctamente cuando sea necesario.
- ✓ No saludar de mano ni tener contacto directo con ningún otro asistente.
- ✓ Continuar practicando el distanciamiento social.
- ✓ Usar una cubierta de tela para la cara.

Las recomendaciones anteriores son específicas para el brote de COVID-19 y deben utilizarse además de las directrices de salud de su empleado.